




KRONİK TOTAL TIKALI LAD LEZYONUNA YAPILAN İPSİLATERAL RETROGRAT PCI -OLGU SUNUMU-

YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÇETİN

ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ABD


HİKAYE


- 66 y, HT ve sigara öyküsü olan erkek hasta,
- Yaklaşık 1 yıldır sınıf 2-3 angina şikayeti, ancak son 2 gündür şiddeti artan angina yakınması ile acile başvurdu
- EKG de inferior da T – mevcut
- FM: patolojik bulgu yok
- CK-MB ve Troponin +
- EKO: LVEF %55, lateral bazal ve orta segmentler de hipokinezi


TANI: AKS


- KAG....

















- LCX OM1 %100 tromboze darlığa 2.5 x12 mm Liberte stent 12 atm yerleştirildi.
- LAD ve RCA lezyonları için CABG önerildi ancak hasta tarafından kabul edilmedi.




- LAD ye ipsilateral IMA kollateral aracılığıyla retrograt PCI planlandı


8F EBU 3.5
kılavuz kateter




Kollateral
Corsair
mikrokateter
eşliğinde
Sion-Blue tel
ile geçildi




Fielder XT




UltimateBros 3




Conquest
pro




RG 3 330 cm
externalizasyon
teli ile
değiştirildi



Y konnektör
den RG 3 ün
her iki ucu
da dışarıda




RG 3 ün
diğer
ucundan
2.0 x15 mm
Accross
CTO Rx
balon
gönderildi




RG3,
Crusade
çift
lümenli
kateter
aracılığıyla
floppy tel
ile
değiştirildi

2.5 x 20 mm
Powerline
balon ile
tekrar dilate
edildi




2.75x34mm
Avior
paclitaxel
kaplı stent
12 atm






2.5x 8mm
Avior stent
12 atm



Sonuç ...



- Katkılarından dolayı Prof.Dr.Sami Özgül'e ve sizlere **Teşekkürler....**