


OLGU SUNUMU


Dr. Mehmet Aksoy
Gaziantep Üniv. Tıp Fakültesi
Kardiyoloji AD


B. K, 48y, erkek

- 5 aydır efor anginası, sınıf 3
- 1 ay önce başka bir merkezde LAD PKG denenmiş, başarılı olmamış, KABG önerilmiş.
- RF: Sigara(+), HL(+)
- FM: Özellik yok.
- EKG: NSR
- EKO: Normal




RCA, CX normal







Corsair mikrokateter, Fielder XT, Pilot 50, Miracle 6.0




Pilot 50, Miracle 6.0, Conquest Pro




Retrograd yaklaşım: Corsair mikrokateter, Sion tel




Diagonal retrograd doluş




Finecross mikrokater, Sion tel, selektif tip injeksiyon




Tip injeksiyon




Finecross mikrokater, Sion, Fielder FC









RG3 tel deęiřim




2.0x30 ve 2.5x12 mm balon dilatasyonlar




Balon dilatasyon sonrası




Crusade çift lümenli mikrokater, Siontel ile LAD distaline geçiş




Diagonale tel, LAD balon dilatasyon



Balon dilatasyon sonrası




3.0x28 mm Absorb







3.0X15 mm NC balon ile postdilatasyon







3.5x28 mm Absorb












3.5x15 mm NC balon postdilatasyon



4.0x8 mm NC balon postdilatasyon



SONUÇ



MESAJ